

TACOS CAMPO



O solipede é um animal herbívoro, por esta razão, a sua sobrevivência e a sua saúde dependem da forragem, pilar fisiológico da sua alimentação.

Nem sempre é possível assegurar uma forragem com qualidade que satisfaça as necessidades diárias.

Indicada para assegurar em casos especiais as necessidades diárias de forragem.

Recomendado para animais que necessitam de um alimento na sua dieta:

- Teores de proteína bruta e de fibra bruta equivalentes a um feno de gramíneas;
- Fibras de alta digestibilidade ("Super Fibras"), podendo administrar-se como complemento da forragem habitualmente utilizada, particularmente nos casos de forragens de baixa digestibilidade e/ou de baixo valor nutricional;

Características Nutricionais

| | |
|-----------------|-------|
| Proteína bruta | 11,2% |
| Fibra bruta | 24,1% |
| Gordura bruta | 3,8% |
| Cinzas totais | 8,3% |
| Cálcio | 0,9% |
| Fósforo | 0,4% |
| Sódio | 0,28% |
| Magnésio | 0,24% |
| Cloro | 0,51% |
| Amido | 4,56% |
| Açúcares totais | 5,19% |
| ED (Mcal/kg) | 1,87 |
| ED (UFC/kg) | 0,58 |

Composição Nutricional

| | |
|--------------|--------|
| Vitamina A | 413UI |
| Vitamina D | 121UI |
| Vitamina E | 13,7mg |
| Vitamina K3 | 0,13mg |
| Vitamina B1 | 0,53mg |
| Vitamina B2 | 0,4mg |
| Vitamina B3 | 0,87mg |
| Vitamina B5 | 1,67mg |
| Vitamina B6 | 0,13mg |
| Vitamina B9 | 0,05mg |
| Vitamina B12 | 3mcg |
| Biotina | 8,0mcg |
| Colina | 10mg |

TACOS CAMPO



Composição Nutricional

Luzerna; Subprodutos forrageiros; Sêmea de Trigo (OGM); Soja (OGM); Derivados de Oleaginosas; Gordura Vegetal; Óleo de Soja (OGM); Melaço de cana-de-açúcar; Vitaminas e minerais

*(OGM- Organismo Geneticamente Modificado)

Modo de utilização

Animais estabulados: 3 a 5kg diários, dependendo do peso, da condição corporal e do tipo de forragem disponível. **Animais a campo:** 3 a 6kg diários, dependendo da idade dos animais e do tipo de forragem disponível.

Administrar como um complemento à forragem. Em éguas reprodutoras afilhadas, **em condições severas de seca com falta de pasto/forragem**, pode administrar-se como alimento alternativo à forragem.

Recomenda-se proporcionar forragem à discrição. Manter sempre água fresca e limpa à disposição do animal.

Microminerais

| | |
|----------|--------|
| Cobalto | 0,01mg |
| Cobre | 1,8mg |
| Ferro | 8,7mg |
| Iodo | 0,07mg |
| Manganês | 7,3mg |
| Selénio | 0,02mg |
| Zinco | 7,3mg |



Validade:
6 meses após a data
de fabrico



Cuidados de armazenamento:
Guardar em local, protegido
da luz, calor e humidade.